



Actinidia



per **FERTIRRIGAZIONE**



per **APPLICAZIONE FOGLIARE**



**FASE
VEGETATIVA**



**FASE
VEGETATIVA**



**PRE
FIORITURA**



**POST
ALLEGAGIONE**



**CRESCITA
FRUTTI**



**FINE
CRESCITA
FRUTTI**



**POST
MATURAZIONE**

AMEX Mg

1-2 applicazioni ogni 7-10 gg.

KEL-OR MIX

2-3 applicazioni, in casi di ingiallimenti

FUERZA

1-2 applicazioni ogni 7-10 gg.

FERTILITY

2 applicazioni

POTENCIADOR Foliar

2 applicazioni, ogni 7 gg.
prima della stasi estiva
1 applicazione
dopo della stasi estiva

AMEX Ca/Mg

2 applicazioni, ogni 7 gg.
prima della stasi estiva
1 applicazione
dopo della stasi estiva

FLAVOR

2 applicazioni, ogni 7 gg.

AMEX Ca/Mg

in caso
di raccolta
ritardata
o posticipata,
ogni 10 gg.

SPALMEX

in associazione a ciascun trattamento foliare

REACTION FOLIAR

in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

ORGALENE MIX

1-2 applicazioni

PURO Mg

1 applicazione

POTENCIADOR DRIP

1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

PURO N

1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

ORGALENE MIX

1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

PURO Ca/Mg

2 applicazioni, ogni 7 gg.
prima della stasi estiva
1 applicazione
dopo della stasi estiva

**RADISTIM
+
PURO K**

1-2 applicazioni,
ogni 10-15 gg.

REACTION DRIP

in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

SPALMEX

in associazione a ciascun intervento di fertirrigazione

