



Ciliegio



per **FERTIRRIGAZIONE**



per **APPLICAZIONE FOGLIARE**

**RIPRESA
VEGETATIVA**

**PRE
FIORITURA**

**POST
FIORITURA**

**POST
ALLEGAGIONE**

**CRESCITA
DEI FRUTTI**

INVAIATURA

MATURAZIONE

AMEX Ca/Mg
2 applicazioni, ogni 7-10 gg.

FERTILITY
1-2 applicazioni, ogni 7-10 gg.

POTENCIADOR Foliar
2 applicazioni, ogni 7 gg.

FLAVOR
2 applicazioni, ogni 7 gg.

AMEX Ca/Mg
in caso di
raccolta ritardata
o posticipata,
ogni 10 gg.

SPALMEX

in associazione a ciascun trattamento fogliare

REACTION FOLIAR

in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

RADISTIM

1-2 applicazioni,
ogni 10-15 gg.

PURO Mg

1 applicazione

POTENCIADOR DRIP

1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

PURO N

1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

PURO Ca/Mg

1-2 applicazioni, ogni 10-15 gg.

RADISTIM + PURO K

1-2 applicazioni,
ogni 10-15 gg.

REACTION DRIP

in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

SPALMEX

in associazione a ciascun intervento di fertirrigazione

