



Uva da tavola



per **FERTIRRIGAZIONE**




per **APPLICAZIONE FOGLIARE**



RIPRESA VEGETATIVA



GERMOGLIAMENTO




FORMAZIONE DEL RACHIDE



PRE FIORITURA




POST FIORITURA



CRESCITA DEI FRUTTI



INVAIATURA



POST MATURAZIONE

FUERZA
2-3 applicazioni, ogni 7-10 gg.

POTENCIADOR Foliar
1 applicazione

FERTILITY
1-2 applicazione

POTENCIADOR Foliar
2-3 applicazioni, ogni 7 giorni

FLAVOR
2 applicazioni, ogni 7 gg.

AMEX Ca/Mg
in caso di raccolta ritardata o posticipata, ogni 10 gg.

AMEX Mg
1-2 applicazioni, ogni 7-10 gg.

AMEX Mg
1-2 applicazioni, ogni 7-10 gg.

AMEX Ca/Mg
2 applicazioni, ogni 7-10 gg.

KEL-OR
2-3 applicazioni, in caso di ingiallimenti fogliari

SPALMEX
in associazione a ciascun trattamento fogliare

REACTION FOLIAR
in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

RADISTIM + PURO N
1-2 applicazioni, ogni 10-15 gg.

POTENCIADOR DRIP
1 applicazione
PURO Mg
1 applicazione

RADISTIM + PURO P
1 applicazione

POTENCIADOR DRIP
1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.
PURO N
1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

RADISTIM + PURO K
1-2 applicazioni, ogni 10-15 gg.

ORGALENE MIX
1-2 applicazioni

ORGALENE MIX
1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.
PURO Ca/Mg
1-2 applicazioni, ogni 10-15 gg.

REACTION DRIP
in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

SPALMEX
in associazione a ciascun intervento di fertirrigazione

