




Uva da vino



per **FERTIRRIGAZIONE**



per **APPLICAZIONE FOGLIARE**



RIPRESA VEGETATIVA



GERMOGLIAMENTO



FORMAZIONE DEL RACHIDE



PRE FIORITURA



POST FIORITURA



CRESCITA DEI FRUTTI



INVAIATURA



POST MATURAZIONE

TOP FOLIAR N

2-3 applicazioni, ogni 7-10 gg.

AMEX Mg

1-2 applicazioni
ogni 7-10 gg.

FERTILITY

1-2 applicazione

TOP FOLIAR N

2-3 applicazioni, ogni 7-10 gg.

TOP FOLIAR K

2-3 applicazioni, ogni 7-10 gg.

AMEX Ca/Mg

in caso di
raccolta
ritardata o
posticipata,
ogni 10 gg.

KEL-OR

2-3 applicazioni, in
caso di ingiallimenti

AMEX Mg

1-2 applicazioni,
ogni 7-10 gg.

SPALMEX

in associazione a ciascun trattamento fogliare

REACTION FOLIAR

in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

RADISTIM + PURO N

1-2 applicazioni, ogni 10-15 gg.

RADISTIM + PURO N

1 applicazione

RADISTIM + PURO N

1-2 applicazioni,
ogni 10-15 gg.

RADISTIM + PURO K

1-2 applicazio
ogni 10-15 gg.

PURO Mg

1 applicazione

ORGALENE MIX

1-2 applicazioni

ORGALENE MIX

1-2 applicazioni, ogni 10-12 gg.

REACTION DRIP

in caso di gelo, grandine, malattie, trattamenti aggressivi, forte carico produttivo

SPALMEX

in associazione a ciascun intervento di fertirrigazione

